

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Zastosowanie produktu
BOTOX®/VISTABEL®
4 jednostki Allergan/0,1 ml
toksyna botulinowa typu A
w leczeniu zmarszczek
pionowych gładzizny czoła

**BOTOX**®
Toksyna botulinowa typu A

**VISTABEL**®
Toksyna botulinowa typu A

Spis treści

- 1** Co to są zmarszczki dynamiczne?
- 2** Co to jest BOTOX®/VISTABEL®?
- 3** Jakie zalecenia poprzedzają leczenie?
- 4** Jak przebiega zabieg?
- 5** Jak należy postępować po zabiegu?
- 6** Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zabiegu?



W jaki sposób ta broszura informacyjna może Ci pomóc?

Twój lekarz zalecił korekcję zmarszczek glabellarnych, czyli pionowych tzw. „lwich” zmarszczek gładziny czoła za pomocą leku BOTOX®/VISTABEL®. Niniejsza broszura zawiera dodatkowe informacje na temat samego zabiegu, jego następstw oraz późniejszego postępowania.

Podobnie jak w przypadku każdego innego leczenia, należy bez wahania zwracać się do swojego lekarza z wszystkimi wątpliwościami i pytaniami.


Przed rozpoczęciem leczenia należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli po zabiegach o analogicznym charakterze wystąpiły w przeszłości u pacjenta następujące objawy:

- Zaburzenia połykania
- Zaburzenia oddychania
- Zaburzenia mowy
- Zwiotczenie mięśni
- Reakcja alergiczna (obrzęk w okolicy twarzy i dróg oddechowych)

1

Co to są zmarszczki dynamiczne?


Procesowi starzenia się towarzyszy powstawanie dwóch typów zmarszczek: zmarszczek dynamicznych spowodowanych nadmierną aktywnością mięśni, do których należą także tzw. „lwie” (lub glabellarne) zmarszczki, oraz zmarszczek statycznych, związanych z utratą przez skórę jej pierwotnej objętości, których przykładem są bruzdy nosowo-wargowe (półokrągłe linie podkreślające granicę pomiędzy policzkiem a okolicą ust).



Powtarzające się wielokrotnie skurcze mięśni prowadzą do pojawienia się zmarszczek dynamicznych.

2 Co to jest BOTOX® /VISTABEL®?

Zakończenia nerwowe uwalniają substancję chemiczną - acetylocholinę. Substancja ta przekazuje do mięśni informację o skurczu.



BOTOX®/VISTABEL® jest toksyną botulinową typu A, której rola polega na czasowym hamowaniu procesu uwalniania acetylocholinę. Dzięki temu powoduje ona rozluźnienie mięśni i redukcję zmarszczek.



„Lwie” zmarszczki powstają w wyniku skurczu trzech mięśni: mięśnia podłużnego, znajdującego się pomiędzy łukami brwiowymi i mięśni marszczących brwi, położonych powyżej łuków brwiowych. Lek BOTOX®/VISTABEL® wstrzykuje się kolejno w poszczególne mięśnie odpowiedzialne za tworzenie tych zmarszczek.


3 Jakie zalecenia poprzedzają leczenie?

- Należy poinformować lekarza o wszystkich przebywanych aktualnie chorobach oraz przyjmowanych lekach, gdyż mogą one wywierać wpływ na leczenie preparatem BOTOX®/VISTABEL®.
- Przed zabiegiem nie należy przyjmować leków przeciwzakrzepowych, aspiryny ani leków przeciwzapalnych, aby uniknąć powstawania wylewów podskórnych.
- Należy poinformować lekarza o stwierdzonej ciąży oraz karmieniu piersią.
- Należy poinformować lekarza o jakichkolwiek problemach, które wystąpiły w związku z poddaniem się leczeniu toksyną botulinową w przeszłości.



4 Jak przebiega zabieg?

BOTOX®/MISTABEL® to toksyna botulinowa w postaci sproszkowanej, przechowywana w fiolce zawierającej 100/50 jednostek substancji czynnej. Lekarz rozpuszcza proszek w roztworze soli fizjologicznej.



Po uzyskaniu właściwej konsystencji roztworu, lekarz nabiera odpowiednią ilość płynu do strzykawki. Następnie przystępuje on do dezynfekcji skóry (oraz oznaczenia miejsc iniekcji), po czym wstrzykuje preparat w kilka punktów w obrębie każdego z mięśni odpowiedzialnych za tworzenie zmarszczek pionowych gładziny czoła.

5 Jak należy postępować po zabiegu?

Aby ograniczyć ryzyko powikłań, należy:

- Przez 24 godziny po zabiegu unikać pocierania i masowania miejsc, w które wstrzyknięto lek.
- Delikatnie oczyścić skórę twarzy, bez pocierania jej, wieczorem w dniu zabiegu.
- Powstrzymać się od nakładania makijażu przez 4 godziny po zabiegu.
- Powstrzymać się od pochylania, wysiłku fizycznego (np. wizyty w siłowni lub zajęć fitness).

Wyniki leczenia stają się widoczne w ciągu tygodnia od zabiegu, zaś maksymalny efekt obserwuje się po upływie 5-6 tygodni po iniekcji. Stwierdzono, że efekt leczenia utrzymuje się do 4 miesięcy od przeprowadzenia zabiegu. Przerwa pomiędzy kolejnymi zabiegami nie może być krótsza niż trzy miesiące.

6

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zabiegu?

Jak każdy lek, BOTOX®/VISTABEL® może powodować u niektórych osób działania niepożądane. Nie należy jednak niepokoić się przedstawioną poniżej listą objawów, gdyż nie oznacza to, że muszą one wystąpić u każdego.

Działania niepożądane występują zwykle w ciągu pierwszych kilku dni po podaniu leku i mają charakter tymczasowy.

Do najpowszechniej spotykanych niepożądanych reakcji na lek należą: ból głowy, opadanie powiek, zaczerwienienie skóry, miejscowe zwiotczenie mięśni i ból twarzy.

Inne działania niepożądane (takie jak: ból, pieczenie, parzący ból, obrzęk i zasinienie) mogą być związane z samą iniekcją.

Bardzo rzadko obserwowano objawy niepożądane, które mogły być związane z przeniknięciem toksyny botulinowej do obszarów oddalonych od miejsca podania leku (takie, jak: zwiotczenie mięśni, zaburzenia połykania lub zachłystowe zapalenie płuc spowodowane przedostawaniem się pokarmu lub płynów do dróg oddechowych).

Należy niezwłocznie poinformować lekarza w razie wystąpienia następujących reakcji na lek:

- Zaburzenia połykania
- Zaburzenia oddychania
- Zaburzenia mowy
- Zwiotczenie mięśni
- Reakcja alergiczna (obrzęk w okolicy twarzy i dróg oddechowych)

BOTOX[®]
Toksyna botulinowa typu A

VISTABEL[®]
Toksyna botulinowa typu A

 **ALLERGAN**

Allergan Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa